

様 検査日 平成 年 月 日

## 大腸内視鏡検査 前処置

検査前日  
月 日

食事

夕食は夜7時頃までに済ませて下さい。  
\*海藻類(わかめ、ひじき)きのこ類、こんにゃくは食べないで下さい。

お薬

21:00にラクソベロン液(10cc) 本を300ccの水で飲んでください。

夜間の水分摂取、お薬の服用は構いません。  
翌朝のまれる下剤を作って冷蔵庫で冷やしておいて下さい。

### 下剤の作り方

パックに水を約500cc入れて  
良く振って完全に溶かします。水を追加して1800ccとします。

検査当日  
月 日

食事

検査が終わるまでは絶食です。  
水やスポーツドリンクは飲まれて構いません。

お薬

抗凝固剤(バファリン、バイアスピリン、ワーファリンなど)を飲まれている方は  
必ず事前に院長にご相談ください。  
その他のお薬は当日お持ち下さい。

起床後に 白い錠剤(ナウゼリン)を 1 錠服用してください。  
胃の動きを良くして吐き気を予防するお薬です。

朝 時から、1800ccの下剤を飲み始めます。

200ml(コップ1杯程度)ずつ約1時間から1時間半かけて全量飲んでください。

ただし吐き気がある場合、気分が悪い場合は無理をせずゆっくりでも構いません。

飲んでいる途中から排便が始まります。  
計5~10回の排便があり、回数が進むにつれ、便は固形から軟便、水様となり  
色は茶色から黄色透明に変わって行きます。  
うすい黄色の水様になれば、前処置は完了です。  
完了までには通常、飲み始めから3時間~4時間ほどかかります。

時ごろ、看護師がご自宅にお電話をいたします。

排便の状況(排便回数、便の色など)を確認させていただき、  
来院時間を指示させていただきます。

何かご不明の点がございましたら、遠慮なくお電話下さい。

診療時間内 092 - 736 - 5601 (川崎胃腸科・内科クリニック)